

## میکرومکس امکس



عناصر ریزمغذی برای رشد گیاه و عملکرد مطلوب محصولات کشاورزی ضروری هستند. ممکن است در شرایط خاص به دلیل نوع خاک، pH و رطوبت خاک، کمبود جدی ریزمغذی‌ها مشاهده شود. کمبود ریزمغذی‌ها موجب از بین رفتن سیستم‌های متابولیک پیچیده‌ای می‌شود که در فتوسنتز، تنفس و ساخت اسیدهای آمینه نقش دارند.

میکرومکس یک امولسیون محلول در آب حاوی کلات عناصر میکرو، منیزیم و گوگرد است. این کود با تامین عناصر ریزمغذی ضروری به متابولیسم گیاه کمک کرده و در نهایت منجر به رشد بهینه آن می‌شود.

عنصر	آهن EDTA	روی EDTA	منگنز EDTA	بُر	مس EDTA	مولیبدن	منیزیم	گوگرد
درصد حجمی	۲/۶	۲/۶	۱/۹۵	۰/۹۷	۰/۳۳	۰/۰۳	۱/۳	۱/۸۲



# میکرومکس امکس

## کاربرد

میکرومکس قابلیت استفاده به صورت همراه با آبیاری و محلول پاشی را دارد. جهت مصرف ابتدا ظرف کود را به خوبی تکان دهید و سپس ظرف سمپاش را تا نصف مقدار آب مورد نیاز پُر کنید. پس از آن مقدار مورد نیاز از کود میکرومکس را اندازه‌گیری کرده و در حالی که به همزدن ادامه می‌دهید کود را به مخزن اضافه کنید. سپس با اضافه کردن آب، به حجم برسانید و محلول پاشی کنید. میکرومکس قابلیت اختلاط با اغلب کودها و سموم را دارد اما بهتر است قبل از آن آزمایش در سطوح کوچک انجام شود. میزان مصرف متوسط این کود ۱ لیتر در هکتار یا ۲۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب است.



زمان مصرف	میزان مصرف		محصول
	میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب	لیتر در هکتار	
شروع از مرحله پنجه‌زنی و پس از آن تا ۲ بار تکرار در مراحل رشد ساقه و زمان سبز شدن خوشه‌ها	۲۵۰	۱	غلات
۳ مرحله کاربرد از زمان تشکیل جوانه تا ظهور برگ دوم	۱۵۰	۱/۵	مرکبات
۲ تا ۴ مرحله کاربرد، مرحله اول در زمان تشکیل جوانه، مرحله دوم ۱۵ روز بعد از مرحله اول، مرحله سوم یک ماه پس از گلدهی	۲۰۰	۱	پنبه
۲ تا ۴ مرحله کاربرد، مرحله اول ۳۰ تا ۴۰ روز پس از جوانه زنی و مراحل بعدی هر ۱۰ روز یکبار	۲۰۰	۱	خیار و ملون
۲ تا ۳ مرحله کاربرد از زمان سبز شدن برگ تا تشکیل میوه	۱۵۰ - ۱۰۰	۱/۵	انگور
۴ مرحله کاربرد از زمان سبز شدن برگ‌ها	۱۵۰	۱/۵	کیوی
۳ تا ۵ مرحله کاربرد، شروع از ۳۰ روز پس از کاشت و سپس هر ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار	۲۰۰	۱	سبزیجات برگی
۲ تا ۴ مرحله کاربرد، شروع از زمان پس از گلدهی و سپس هر ۳۰ روز یکبار	۱۰۰	۱	میوه های آجیلی
۳ مرحله کاربرد روی درختان بالغ و در زمان پس از تشکیل میوه، پس از آن هر ۱ ماه یکبار	۱۵۰	۱/۵	زیتون
۲ تا ۴ مرحله کاربرد، شروع از ۳۰ روز پس از کاشت و سپس هر ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار	۱۵۰	۰/۷۵	پیاز
۲ تا ۳ مرحله کاربرد، شروع از زمان تشکیل جوانه و سپس هر ۱۰ روز یکبار	۱۵۰	۱	لوبیا و نخود
۲ تا ۵ مرحله کاربرد در فواصل ۱۵ روزه	۲۵۰	۱	سیب زمینی
۳ مرحله کاربرد، مرحله اول ابتدای بهار، مرحله دوم بعد از اولین برداشت و مرحله سوم یک ماه بعد از مرحله قبل	۱۰۰	۱	چای
۲ تا ۵ مرحله کاربرد، شروع از زمان گلدهی و سپس هر ۱۰ روز یکبار	۱۰۰ - ۲۰۰	۱	گوجه فرنگی

## موارد احتیاط

محصول را در مکانی نگهداری کنید که از یخ‌زدگی دور بوده و در محدوده دمایی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد باشد. میکرومکس یک کود برگ‌غیر خطرناک و غیر قابل اشتعال است. هنگام استفاده از دستکش و محافظ صورت استفاده شود. در صورتی که طولانی مدت نگهداری شود ممکن است ذرات مغذی در انتهای ظرف ته‌نشین شوند که بعد از خوب تکان دادن ظرف این ذرات حل می‌شوند.

# OMEX

