

کود ریز مغذی

بیبوددهنده فروتست و شکل میوه

antisan



R
ROYAL
رویال میزان کشاورزی ایران



فروتست یا میوه‌نشینی مرحله تبدیل تخمدان از گل به میوه در حال رشد است و چند روز پس از باز شدن گل اتفاق می‌افتد. در واقع فروتست زمانی است که یک گل با موفقیت گرده افسانی می‌شود. در اغلب میوه‌ها به این صورت است که رشد تخمدان تحریک می‌شود و سایر قسمت‌های گل، مانند پرچمها و گلبرگها، معمولاً پژمرده شده و از بین می‌رونند. چنین تغییراتی مشخصه تبدیل یک گل به یک میوه جوان است. در مرحله اول رشد میوه همه بافت‌ها تعداد سلول‌های خود را افزایش می‌دهند و در نتیجه میوه به انرژی بیشتری نیاز دارد. بنابراین احتمال سقط میوه و ریزش گل در این مرحله بسیار زیاد است. چنانچه میوه مرحله اول رشد را طی کند، تا زمان بلوغ به رشد خود ادامه می‌دهد و احتمال ریزش میوه کمتر خواهد بود.



FLOWERBEST

فلاوربست

فلاوربست یک کود پودری است که با فرمولاسیون ویژه جهت افزایش فروتست و جلوگیری از ریزش میوه طراحی شده است. ترکیب خاص این محصول علاوه بر افزایش میوه‌نشینی باعث بهبود شکل و فرم میوه می‌شود.

عنصر	منگنز	روی
درصد جرمی	۵	۳




FLOWERBEST



جهت مصرف کود فلاوربیست ابتدا سمپاش را کالیبره کرده و تا نیمه از آب پر نمایید. سپس مقدار مورد نیاز از کود را درون ظرفی به غیر از مخزن سمپاش که مقداری آب در آن است اضافه نمایید. در این مرحله محلول را به خوبی هم بزنید تا یکنواخت شود. محلول آماده شده را درون مخزن سمپاش ریخته و پس از افزودن مابقی آب لازم، اقدام به محلول پاشی نمایید. فلاوربیست با اغلب کودها و آفت کش ها قابل اختلاط است. با این حال، در صورت نیاز به محلول نمودن این کود با سایر مواد می بایست ابتدا در سطح کوچکی آزمایش انجام دهید. میزان مصرف محلول پاشی ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب در دو مرحله به فاصله شش روز و به صورت آبیاری ۴ کیلوگرم در هکتار است.

زمان مصرف	میزان مصرف		محصول
	محلول پاشی	کاربرد در خاک	
مرحله اول شروع گلدهی مرحله دوم اواسط گلدهی مرحله سوم (در صورت عدم انجام یکی از مراحل قبل) اواخر گلدهی	۱ در هزار	۴ کیلوگرم در هکتار	سبزیجات (گوجه فرنگی، فلفل، خیار، بادمجان، ملون، هندوانه، لوبیا) گلخانه و فضای باز
مرحله اول شروع گلدهی مرحله دوم اواسط گلدهی تکرار در صورت لزوم	۱ در هزار	۴ کیلوگرم در هکتار	توت فرنگی
دوران گلدهی	۱ در هزار	۴ کیلوگرم در هکتار	انگور
مرحله اول اواخر گلدهی مرحله دوم یک هفته بعد	۱ در هزار	۴ کیلوگرم در هکتار	درختان میوه (سیب، گلابی، به، هلو، گیلاس، آلو، انار، کیوی)
مرحله اول اواسط گلدهی مرحله دوم اواخر گلدهی	۱ در هزار	۴ کیلوگرم در هکتار	مرکبات (پرتقال، نارنگی، لیمو، گریپ فروت)



www.royalsakar.ir



رویال، نماینده انحصاری محصولات آنتیلیسان در ایران

تهران، خیابان مفتح، خیابان نقدی، پلاک ۴۰



۰۲۱ - ۸۸ ۵۰ ۲۰ ۲۰



royal.sakar